

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP			
		IH			
		cena			
00	(OGLEJENÁ) SVĚŽÍ JEDLODUBOVÝ BOR <i>Pinetum quercino-abietinum variohumidum mesotrophicum</i>	SM 26 BO 24 EP 2 PP4 IH - C 2,78	• pahorkatiny, pánve (jihočeské a podkrušnohorské), širší úvaly, ploché vyvýšeniny, plošiny, kambizem oglejená dystrická arenická, podzol arenický oglejený až glejový , hluboká, hlinitopísčitá - písčitá, čerstvě vlhká • PLO: 2,9,15,17,18,20 • 533 ha – 0,02%	BO 7-8 DB ±2 JD 1 BŘ 1 SM 0-1 • <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Sphagnum</i> sp., <i>Molinia arundinacea</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Avenella flexuosa</i>	
Sdružuje relativně nejpříznivější stanoviště chlumních borů na oglejených půdách. Příznivějším se jeví především bonitou BO, méně vegetací a půdním typem (jinak by nemohla BO v dlouhodobém vývoji uhájit svou dominanci). Vedle bonitní BO tvoří přirozenou příměs DB a JD, které někdy v oblastech (půdněklimatických) variantách chybějí. V cílové skladbě se upravuje poměr DB a BO ve prospěch kvalitní BO, pokud DB neposkytuje cenné sortimenty.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
do r. 2015		od r. 2016		(řazeno abecedně nezávisle na čísle LT vlevo)	
0				00-	modální
1	borůvkový		modální březodubový		
2	metlicový (se šťavelem)		modální jedlodubový		
3					
4					
5	ostřicový				
6					
7					
8					
9	– podle oblastí				

