

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP				
		IH				
		cena				
0Q	(OGLEJENÝ) CHUDÝ JEDLOVÝ BOR <i>Pinetum quercino-abietinum variohumidum oligotrophicum</i>	BO 20	• nejchudší soubor „borů s jedlí“ na chudém podloží permokarbonu a terciéru, zvlněné plošiny a mírné vyvýšeniny, podzol oglejený, kaolinický, arenický , střídavě vlhká, jílovitopísčitá až písčitohlinitá • PLO: 1,2,6,8,910,12,15,19 • 4 892 ha – 0,18%	BO 7-8 DB ±2 JD ±1 BŘP1 SM 0-1		
		EP 2				
		PP 1		• <i>Molinia sp., Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Leucobryum glaucum, Sphagnales, Lichenes</i>		
		IH - D				
		1,50				
Společenstvo „tajgového“ typu. Je obdobou souboru OM na nepropustných střídavě zamokřovaných a vysychavých půdách. Patří k nejpřirozenějším plošně souvislým pahorkatinným borům s malou příměsí DB (DBZ) a JD, ve vyšších polohách se SM, na nejchudších typech jen s BŘ (popř. BŘP). V cílové skladbě se udržuje výrazná převaha BO, z přimíšených zajišťuje ekosystém DB (DBZ), JD a BŘ (BŘP). Oblastní var. vlhčích poloh je jdBOR, na zrašelinělých půdách se SM (přechod ke smBORu).						
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
do r. 2015			od r. 2016		(řazeno abecedně nezávisle na čísle LT vlevo)	
0				0Q-	modální	
1	(chudý jedlový bor) borůvkový		modální	0Qk	antropogenní	
2	brusinkový			0Qz	zakrslejší	
3	bezkolencový					
4			sušší			
5	chudý jedlový bor (smBO)		vlhčí			
6						
7						
8						
9						

