

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP			
		IH			
		cena			
OX	DEALPINSKÝ (BAZICKÝ ZAKRSLÝ) BOR <i>Pinetum dealpinum</i> (<i>xerothermicum</i>)	BO 14	• ojediněle ostrůvkovitě na vápencích a hadcích, na prudkých svazích a skalnatých hřebetech, rendzina modální, kambická, suťová, litozem a ranker modální, karbonátové na hadci hořečnaté,, extrémně mělká, vyprahlá, silně kamenitá • PLO: 8,33,35 • 121 ha – +%	BO 7-9 DBZ ±2 BK 0-2 HB 0± LP 0± BŘ 0-1 břek 0± muk 0± teplomilné keře	
		DB 10-14			
		EP 5		• <i>Sesleria albicans</i> , <i>Clematis recta</i> , <i>Asperula cynanchica</i> , <i>Allium senescens</i> , <i>Thlaspi montanum</i>	
		PP 1			
		IH - E			
	1,08				
	Jako relikť z poledové doby, reprezentuje extrémní podmínky na karbonátových horninách v 2. – 3. (příp. 4.) lvs. Značně propustné půdy mají malou retenční schopnost pro vodu, přeměny opadu jsou zpomalené – půdy vyprahnou. V těchto extrémních podmínkách vystupňovaných silnou insolací a vysokou teplotou slunných poloh převládá původní BO s přirozenou příměsí DB, HB, BŘ, (výše i BK) i teplomilnějších dřevin a keřů v nesouvislém podrostu.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	do r. 2015		od r. 2016	(řazeno abecedně nezávisle na čísle LT vlevo)	
0			antropogenní	OXf	hadcový
1	s válečkou prapořitou		karbonátový	OXw	vápencový
2	pěchavový		silikátový		
3	hadcový		hadcový		
4					
5					
6					
7					
8					
9					

