

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP			
		IH			
		cena			
9R	VRCHOVIŠTNÍ KLEČ (KLEČOVÉ VRCHOVIŠTĚ) <i>Mughetum turfosum</i>	SM 6	• klečová vrchovištní rašeliniště (Krkonose, Šumava, Krušné hory, Jeseníky, Jizerské hory), plošiny, poklesliny, mírné svahy, s podložím kyselého krystalinika, organozem fibrická oligotrofní, podzol histický glejový , vrchoviště nebo mokřiny • PLO: 1,3,13,14,21,22,27 • 2 393 ha – 0,09%	KOS 6-10 SM ±1 BŘP ±2 JŘ + (BL 3-5)	
		EP 6			
		PP (1)		• <i>Eriophorum vaginatum</i> , <i>Vaccinium uliginosum</i> , <i>Oxycoccus quadripetalus</i> , <i>Andromeda polifolia</i> , <i>Empetrum nigrum</i> , <i>Empetrum hermaphroditum</i> , <i>Vaccinium myrtillus a vitis-idaea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Polytrichum strictum</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Carex fusca</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Carex canescens</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Trichophorum alpinum</i> , <i>Betula nana</i>	
		IH - E			
		1,09			
Je společenstvem extrémních půdních a klimatických (vrcholových alpinských) podmínek v plochých terénech s různě mocnou vrstvou mokré vrchovištní rašeliny, na povrchu oživené nebo odumřelé (sušší typy). Ráz určuje křovitá forma blatky nebo kosodřevina, příp. výskyt rašelinných jezírek (šumavské „slatě“). Ve fytocenóze převažují keříčky brusnicovitých, časté jsou vrchovištní druhy. Typickým keříkem je <i>Betula nana</i> , či <i>Oxycoccus sp. a Empetrion sp.</i>					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
do r. 2015			od r. 2016		
0	přechodová (PLO 22)			9R-	modální
1	- podle oblastí		modální	9Ri	iniciální
2	- podle oblastí		iniciální	9Rv	vysokohorská
3	mechová (PLO 22)		sušší		
4			bohatší		
5			azonální modální		
6			azonální s BO rašelinnou		
7			azonální bezklečové		
8					
9					

