

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)				
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ				
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)				
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)				
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)				
0C	HADCOVÝ BOR <i>Pinetum serpentinicum</i>	SM 24	- na hadcovém podloží, v různých terénních a půdních podmínkách, kambizem rankerová či oglejená hořečnatá, ranker kambický hořečnatý, pseudoglej modální hořečnatý, v horní části svahů sušší, mělčí, ve spodní části oglejená, hlinitá, šterkovitá, prosýchavá - PLO: 3,10,12,13,16,28,33 1 600,25 ha – 0,06 %	BO 7-8 DB ±2 BK 0-2 JD 0± HB 0± LP 0± BŘ 0-1 břek 0± muk 0± keře <i>Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, Molinia caerulea, Convallaria majalis, Potentilla erecta, Calamagrostis villosa, Asplenium cuneifolium, Brachypodium sylvaticum</i> L8.1/L8.3/L8.2 - Boreokontinentální bory/Perialpidské hadcové bory/Lesostepní bory 4A(D)2-3/5(6)A(D)2-3/3-4D1-2 - Pineta serpentini inferiora/Pineta serpentini superiora/Pineta dealpina superiora LFB04/LEA01/LFA01 - <i>Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris/Thlaspio montani-Pinetum sylvestris/Festuco-Pinetum sylvestris</i>				
		BO 22						
		EP 4						
		PP 2						
		IH - D						
		2,27						
		Je zcela specifickým společenstvem přirozených borů na vyhraněném podloží, které rozhodným způsobem ovlivňuje dřevinnou skladbu a podmínky pro existenci lesa vůbec. V rámci těchto specifických podmínek se stírají menší rozdíly přiřazených lesních typů (oglejených). Přirozeně rozvolněné stejnorodé porosty BO mívají v podrostu jen BŘ a SM, který se v 5. lvs podílí i na úrovni (sm BOR --> ON). Jednotlivou příměs (podle lvs) tvoří DBZ, BK, JD. Cílová skladba se blíží přirozené.						
		Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
		od r. 2019				do r. 2018		
		0				antropogenní		
		1				modální	– podle oblastí (borůvkový)	0C-
2	-	oglejený (se třtinou rákosovitou a chloupkatou)						
3	bohatší	kostřavový	0Ca	kamenitý acerozní				
4	sušší	s válečkou prapořitou						
5	vlhčí	válečkový	0Cg	vlhčí				
6	sušší bohatší	– podle oblastí						
7	Bazický BOR bukový skeletnatý		0Cz	zakrslejší				
8	Bazický BOR bukový modální							
9	Bazický BOR bukový vlhčí							

