

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
0G	GLEJOVÝ SMRKOVÝ BOR (PODMÁČENÝ) <i>Piceeto-Pinetum paludosum</i> (mesotrophicum)	SM 26	• v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách, (v obvodu jihočeského miocénu, severočeského křídového pískovce, západočeského hadce), glej arenický histický podzolovaný, či podzol arenický glejový histický , písčité až jílovitopísčité, zrašelinělá • PLO: 1,2,3,6,9,12,15-19,31 • 6 932,17 ha – 0,25 %	BO 5-8 SM ±4 BŘP 1-2(DB OL) 0±	
		BO 26		• <i>Molinia sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis villosa, Vaccinium uliginosum, Calluna vulgaris, Oxycoccus quadripetalus, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Lysimachia vulgaris, Pteridium aquilinum</i>	
		EP 2,5		L10.2/L9.2 - Rašelinné brusnicové bory/Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		PP 4		4A4 - Pini-piceeta sphagnosa	
		IH - C		LFD02 - <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris</i>	
		3,60			
Je poměrně vyhraněný nejen půdou a fytocenózou, ale především dřevinnou skladbou „tajgového“ typu s BO a SM převážně nadprůměrné bonity (u třeboňské BO špičkové). V chladnějších polohách na jílovitopísčitých zrašelinělých půdách se stoupajícím zastoupením SM přechází do podmáčené boSM s nadprůměrnou produkcí. Cílová skladba kopíruje přirozenou s mírnou preferencí ekonomicky výhodnějšího SM. Předpokladem jsou vhodné ekotypy SM a BO.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní	– podle oblastí			
1	modální	bezkolencový (s borůvkou)		0G-	modální
2	chudší	bezkolencový na hadci		0Gt	chudší
3	-	třtinový (s borůvkou)			
4	-	rojovníkový			
5	-				
6	-				
7	specifický - histický				
8	glejová borová smrčina specifická - bohatší	podmáčená borová smrčina metličková		0Gr	borová smrčina rašelinná
9	specifický - hadcový	podmáčená borová smrčina třtinová (se štavelem) (s bezkolencem)		0Gf	hadcový

