

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
OK	Kyselý bor (<i>Querceto-Fagi</i>) - <i>Pinetum acidophilum</i>	BO 22	• v oblastech písčitých sedimentů a písčité zvětrávajících hornin, pahorkatiny, slunné svahy, podzol arenický, kambizem dystrická arenická , písčitá, propustná, vysýchavá • PLO: 1-6,8-12,15-21,23,24,30, 31 • 38 071,67 ha – 1,39 %	BO 7-8 DBZ ±2 BK 0-1 BŘ ±1 SM 0±	
		DB 18		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Dicranum sp.</i>	
		BK 18		L8.1/L7.3 - Boreokontinentální bory/Subkontinentální borové doubravy	
		EP 1,5		4A3- Querci-pineta	
		PP 2		LFB02/LDA03 - <i>Vaccinio myrtilli-pinetum sylvestris/Vaccinio vitis-idaee-Quercetum roboris</i>	
		IH - C			
		2,44			
Společenstvo „tajgového“ typu. Je v rámci submontánních borů nevyhraněným přechodovým společenstvem, vzhledem k méně exponovanému stanovišti, kde při nahromaděném surovém humusu a keříčkovém drnu byl silným konkurentem pro BO především DBZ. V příměsi se poměr DBZ a BK liší více podle charakteru oblasti než podle klimatu. Také azonální výskyt SM se liší oblastně. Cílová skladba se blíží přirozené ovšem v podmínkách pro DBZ a BK druhotně zhoršených.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	iniciální stadia		OKk	antropogenní
1	modální dubový	kyselý dubový bor borůvkový		OKdb	dubový
2	modální dubobukový	kyselý dubový bor na výrazných podzolech		OKbd	dubobukový
3	modální bukový	kyselý dubobukový bor borůvkový		OKbk	bukový
4	-	kyselý dbBK bor na kamen. výraz. podzolech		OK-	modální
5	bohatší	kyselý bukový bor borůvkový		OKs	svěžejší
6	-	kyselý bukový bor na výrazných podzolech			
7	vlhčí	– podle oblastí			
8	-	– podle oblastí,			
9	specifický – na zahliněných písčích	svahový (– podle oblastí)		OKe	svahový

