

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
0M	CHUDÝ BOR (<i>Querceto</i>)- <i>Pinetum oligotrophicum</i>	BO 20	- v obvodech minerálně chudých písčitých půd, podzol arenický, středně výrazný, regozem arenická, písčitá - štěrkovitá, propustná, vysychavá, silně kyselá - PLO: 2-6,9-12,15-21,23,31 14 225,75 ha – 0,52 %	BO 8-10 DBZ ±1 BŘ ±1 BK 0± SM 0±	
		DB 18		<i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Vaccinium vitis-idaea</i>, <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Cladonia sp.</i>, <i>Cetraria sp.</i>, <i>Leucobryum glaucum</i>, <i>Dicranum undulatum</i>, <i>Dicranum scoparium</i>	
		EP 1		L8.1 - Boreokontinentální bory	
		PP 1		4A2/1A-AB2 - Querci-pineta/Pineta lichenosa/Pini-querceta arenosa	
		IH - D		LFB02/LFB01 - <i>Vaccinio myrtilli-pinetum sylvestris</i> / <i>Cladino-pinetum sylvestris</i>	
		1,80		Chudý bor (s dubem) je půdně podmíněným společenstvem převážně 2. – 4. lvs. Jeho původnost v podmínkách mírného pásu Evropy lze vysvětlit jako dodatečné šíření BO z drobných postglaciálních reliktů v extrémních polohách (OZ, OY) na přilehlá plošně významnější chudá stanoviště, kde chyběla konkurence náročnějších listnáčů. V extrémních podmínkách zvýšit podíl BŘ; využít SM v podrostu.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní		– podle oblastí	0Mk	antropogenní
1	modální		vřesový	0M-	modální
2	chudší		– podle oblastí	0Mz	zakslejší
3	-		borůvkový (s brusinkou)	0Mbk	bukový
4	-				
5	-		lišejníkový		
6	-		na dunách	0Mq	na dunách
7	-		– podle oblastí		
8	-				
9	specifický na dunách		svahový (brusinkový)	0Me	svahový

