

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
0Q	OGLEJENÝ CHUDÝ BOR (JEDLOVÝ) <i>Pinetum quercino-abietinum variohumidum oligotrophicum</i>	BO 20	• nejchudší soubor „borů s jedlí“ na chudém podloží permokarbonu a terciéru, zvlněné plošiny a mírné vyvýšeniny, podzol oglejený, kaolinický, arenický , střídavě vlhká, jílovitopísčitá až písčitohlinitá • PLO: 1,2,6,8,910,12,15,19 • 4 562,93 ha – 0,17 %	BO 7-8 DB ±2 JD ±1 BŘP1 SM 0-1		
		EP 2		• <i>Molinia sp.</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium uliginosum</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Sphagnales</i> , <i>Lichenes</i>		
		PP 1				
		IH - D				
		1,72				
	Společenstvo „tajgového“ typu. Je obdobou souboru OM na nepropustných střídavě zamokřovaných a vysýchavých půdách. Patří k nejpřirozenějším plošně souvislým pahorkatinným borům s malou příměsí DB (DBZ) a JD, ve vyšších polohách se SM, na nejchudších typech jen s BŘ (popř. BŘP). V cílové skladbě se udržuje výrazná převaha BO, z přimíšených zajišťuje ekosystém DB (DBZ), JD a BŘ (BŘP). Oblastní var. vlhčích poloh je jdBOR, na zrašelinělých půdách se SM (přechod ke smBORu).					
	Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018			
	0	antropogenní			0Qk	antropogenní
	1	modální		(chudý jedlový bor) borůvkový	0Q-	modální
	2	-		brusinkový		
3	-		bezkolencový			
4	sušší					
5	vlhčí		chudý jedlový bor (smBO)			
6	-			0Qz	zakrslejší	
7	-					
8	-					
9	-					

