

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (<i>KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010</i>)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (<i>BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971</i>)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (<i>VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013</i>)	
OR	RAŠELINNÝ BOR <i>Pinetum turfosum</i> (BLATKOVÝ BOR) (BOROVÁ BŘEZINA) <i>Pineto-Betuletum</i>	SM 4-10	• plošiny a ploché úžlabiny, pánve (zejména jihočeské), vrchoviny, organozem, fibrická, mesická, oligotrofní, místy organozem glejová, podzol histický arenický glejový, podzemní voda 0,1 – 0,4 m pod povrchem • PLO: 2,3,10,11, 13, 14,15,16,18, 27 • 3 985,53 ha – 0,15 %	BO 7-9 SM ±2 BŘP ±2 BL 0±	
		BO 4-16		ORt: BL 8 BŘP 1-2 SM + BO 0±	
		EP 5		• <i>Vaccinium myrtillus a vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus quadripetalus, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Molinia caerulea, Drosera rotundifolia, Sphagnum sp., Polytrichum commune</i>	
		PP 1		L10.2/L10.3/L10.4/L10.1 - Rašelinné brusnicové bory/Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť/Blatkové bory/Rašelinné březiny	
		IH - E		4-5A6/4-6A6 - Pineta turfosa/Pineta rotundatae	
		2,02		LFD02/RCA04/LFD03/LFD01 - <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris/Sphagno-Pinetum sylvestris/Vaccinio-Pinetum montanae/Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i>	
	Rašelinný (blatkový) BOR zaujímá, jako relikť z chladného období postglaciálu, několik vývojových článků, z nichž nejtypičtější je „blatkový“ BOR, který osidluje živé i odumírající části podhorských (pánevních) rašelinných ložisek (typy s rojovníkem na Třeboňsku). Závěrečnou fází je rašelinný BOR, v němž je blatka vystřídána BO lesní. Přípustná skladba se oproti přirozené neliší.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019	do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	borůvkový		OR-	modální
2	sušší	(borůvkový) rojovníkový		ORv	horský
3	zakrslý	– podle oblastí		ORz	březový zakrslejší
4	blatkový modální			ORt	blatkový
5	blatkový sušší	blatkový bor borůvkový (srojovníkem) (na rašelině)			
6	-	blatkový bor rojovníkový			
7	-	– podle oblastí			
8	-				
9	Rašelinná borová březina iniciální přírodní - extrémní			ORi	iniciální - borová březina

