

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1C	VYSÝCHAVÁ HABROVÁ DOUBRAVA (SUCHÁ) <i>Carpineto.Quercetum subxerothermicum</i>	BO 20	• v horních částech slunných svahů a suchých hřebítků, nížiny, pahorkatiny, bohaté podloží, kambizem modální až rankerová mezotrofní-eutrofní, pararendzina modální, kambická , středně hluboká, kamenitá, ne zcela vyvinutá • PLO: 2,4,5,6,8,9,10,17,18,30,33, 35,36,38 • 10 916,47 ha – 0,40 %	DBZ 6-8 HB ±3 LPM ±2 BK 0± BO 0± (břek BB muk) 0± CER 0-2	
		DB 20		• <i>Poa nemoralis, Brachypodium pinnatum, Viscaria vulgaris, Campanula persicifolia, Silene nutans, Potentilla alba, Pyrethrum corymbosum, Trifolium alpestre, Melica nutans</i>	
		EP 4		L3.1/L3.3/L3.4/L6.4/L6.1/L6.2/L6.5 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Panonské dubohabřiny/Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy/Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy/Panonské teplomilné doubravy na spraši/Acidofilní teplomilné doubravy	
		PP 2		2B3x/2AB3x/1D2-3/1CD2-3 - Carpini-querceta typica/Carpini-querceta/Corni-querceta petraeae-pubescentis inferiora/Corni-acereta inferiora	
		IH - D		LBB01/LBB03/LBB04/LCA/LDA01/LCC01/LCA03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/ Carici pilosae-Carpinetum betuli/Primulo veris-Carpinetum betuli/Quercion pubescenti-petraeae/Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae/Sorbo torminalis-Quercetum/Euphorbio-Quercetum</i>	
	2,29				

