

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1F	SVĚŽÍ KAMENITÁ HABROVÁ DOUBRAVA <i>Quercetum lapidosum mesotrophicum</i>	DB 20	- na kamenitých svazích a hřebenech nižších poloh, neutrální až bazické podloží, přechod kambického rankeru do rankerové kambizemě, středně hluboká, kamenitá, propustná, mírně vysychavá - PLO: <i>nová jednotka <- 1N</i> 48,97 ha – +%	DBZ 6-9 HB 0-2 BO 0-1 LPM 0-2 (JLM JV JS OS BŘ BB TŘ) 0-2	
		EP 4		<i>Calamagrostis arundinacea, Rubus fruticosus agg., Poa nemoralis, Festuca ovina, Coronilla varia, Carex montana, Anthericum ramosum, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Armeria vulgaris, Brachypodium sylvaticum, Melica nutans</i>	
		PP 2		L3.1/L3.3/L3.4 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Panonské dubohabřiny	
		IH - D		2B3X - Carpini-querceta typica	
		-		LBB01/LBB03/LBB04 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/Carici pilosae-Carpinetum betuli/Primulo veris-Carpinetum betuli</i>	
				Kamenitá (hb) DBZ je na minerálně bohatším podloží charakterizována exponovanou polohou na svazích a hřebenech, kde vývoj půdy je omezen. Vysoký podíl skeletu se na zvýšení půdní vlhkosti (kondenzační vláhou) projevuje jen nepatrně. V cílové skladbě je BO zčásti ekonomicky výhodnější než méně kvalitní DBZ, který zajišťuje trvalost ekosystému.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		se třtinou rákosovitou <- 1N	1F-	modální
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

