

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘÍROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1H	HLINITÁ HABROVÁ DOUBRAVA (ŽIVNÁ – SPRAŠOVÁ) <i>Carpineto--Quercetum illimerosum mesotrophicum</i>	BO 22	• v teplejších oblastech a okrajových polohách pahorkatin na plošinách a mírných svazích, na spraších, sprašových hlínách, hnědozem a luvizem modální, černozem, pararendzina kambická přesýchavá • PLO: 5,8, 17,18,30,33,35,36 • 6 422,53 ha – 0,23 %	DBZ 8 HB 2 LP + břek + keře + • <i>Poa memoralis, Festuca heterophylla, Potentilla alba, Brachypodium pinnatum, Vincetoxicum hirundinaria, Melittis melissophyllum, Vinca minor, Lithospermum purpurocaeruleum</i> L3.1/L3.3/L3.4/L6.4/L6.2 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Panonské dubohabřiny/Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy/Panonské teplomilné doubravy na spraši 1BD3/2BD3x/2B3 - Ligustri-querceta/Carpini-querceta tiliae/Fagi-querceta typica LBB01/LBB03/LBB04/LCC03/LCB01 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/ Carici pilosae-Carpinetum betuli/Primulo veris-Carpinetum betuli/Melico pictae-Quercetum roboris/Quercetum pubescenti-roboris</i>	
		DB 22			
		EP 3			
		PP 3			
		IH – D			
		3,64			
Jsou klimaxovým společenstvem se specifickými vlastnostmi mírně uléhavých půd s málo vyvinutým (mělkým) humusovým horizontem (mineralizace opadu). Ve vrstevnaté výstavbě tvoří pod DBZ spodní etáž HB a LP. Pestré je keřové patro, zejména na přechodech k xerothermní habrodřínové doubravě. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému vedle nosného DBZ i meliorační etáž stinných dřevin a keřů, sloužící i jako krycí etáž půdy. (<i>Jednotky 1H6, 1H7, 1H8 - převedeny na 1C</i>)					
Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR			
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální		s válečkou prapořitou	1H-	modální
2	chudší		– podle oblastí		
3	bohatší		s ostřicí horskou		
4	sušší		válečková		
5	-		brčálová		
6	->1C		habrodřínová doubrava	1Hx	vápnitá habrodřínová
7	->1C		habrodřínová doubrava kamejková s ostřicí hor.		
8	->1C		habrodřínová doubrava kamejková s vál. prapoř.		
9	-		– podle oblastí (ostružiníková)		

