

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1I	Kyselá hlinitá DOUBRAVA (ULÉHAVÁ) <i>Quercetum illimerosum acidophilum</i>	SM 24 BO 24 DB 22	● na plošinách a mírných svazích, překryvy spraší a hlín, luvizem arenická až modální, kambizem luvická oligotrofní, oglejená, až hnědozem, oglejená , hlinitá (písčito-hlinitá-jílovitohlinitá), méně propustná, vysychavá ● PLO: 2,8,17 ● 1 365,73 ha – 0,05 %	DBZ 6-7 BK 0-1 LPM 0-(1) HB 0-(1) BŘ ±1 BO 0±	
		EP 2		● <i>Luzula pilosa</i> , <i>Melampyrum pratense</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , (<i>Rubus fruticosus</i> , <i>Convallaria majalis</i>)	
		PP 2,5		L7.1 - Suché acidofilní doubravy	
		IH - C		1AB3 - Querceta	
		3,12		LDA01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> - <i>Quercetum petraeae</i>	
Nepříznivé ekologické podmínky (viz 1K) jsou zde poněkud zmírněny (menší výpar i propustnost půd) vzhledem k hlinitějším překryvům půd. Převažující DBZ je proto vzrůstnější a zapojenější, v příměsi je HB a LP, BŘ a BO ojediněle. V cílové skladbě je DBZ základní dřevinou trvalosti ekosystému; je v úrovni i podúrovni, kde s LP a HB (tyto více na přechodu do 2. lvs) tvoří etáž pro krytí půdy i podporu úrovně BO.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	Antropogenní				
1	Modální		zkyselená	1I-	modální
2	Chudší		zkyselená s válečkou prapořitou		
3	-		lipnicová		
4	-		černýšová		
5	-		kostřavová		
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifická - písčité				

