

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1K	Kyselá doubrava <i>Quercetum acidophilum</i>	BO 20	• v nížinách na plošinách a mírných svazích, v pahorkatinách na slunných svazích a hřebenech, na kyselých horninách, kambizem modální, arenická, psefitická, občas podzol arenický , středně hluboká, propustná, vysychavá • PLO: 4,5,6,8,9,10,17,30,33,35 • 4 458,00 ha – 0,16 %	DBZ 7-9 BŘ ±1 BO 0-1 (LPM HB BK) 0±	
		DB 18		• <i>Festuca ovina</i> , <i>Agrostis vulgaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Sieglingia decumbens</i> , <i>Hypnum cupressiforme</i> , <i>Dicranum scoparium</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Luzula luzuloides</i>	
		EP 1,5		L7.1 - Suché acidofilní doubravy	
		PP 2		1(A)AB3 - Querceta	
		IH - C		LDA01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> - <i>Quercetum petraeae</i>	
		1,58			
				Málo příznivé ekologické podmínky (vysoká teplota i výpar) a hromadění opadu podmiňují vznik ± nesmíšených doubrav omezeného vzrůstu s přimíšenou BŘ. Jednotlivý HB (případně BK, LP), jen na styku s 2. lvs, BO na písčitých přechodech k „borům“. Dřeviny náročnější na vlhkost a mělkokořenicí se nemohou uplatnit. V cílové skladbě má DBZ rozhodující roli pro trvalost ekosystému, i když převážně jako krycí a podpůrná dřevina pod BO.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019	do r. 2018
0	antropogenní			1Kk	antropogenní
1	modální		kostřavová	1K-	modální
2	-			1Km	chudší
3	-		kostřavová s lipnicí		
4	-		metlicová		
5	-		psinečková		
6	-				
7	-		biková		
8	-		borůvková		
9	-		– podle oblastí	1Ke	svahová

