

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1L	NÍŽINNÝ LUH (JILMOVÝ) <i>Ulmeto-Quercetum alluviale</i>	DB 28	● okraje úvalů, na kdysi zaplavovaných říčních terasách, fluvizem kambická, modální, méně oglejená až glejová, ojediněle arenická, černice, (pseudoglej), značně vyvinutá, písčitá až jílovitá ● PLO: 2-4,9,10, 12,15,17,23,26,29,31-35,37,39,41 ● 31 578,10 ha – 1,15 %	DBL 4-7 HB 0-2 JV ±2 JS 1-3 JL 1-3 LP ±2 OLL ±1 (TPB TPČ) 0± JSÚ 0-1	
		JS 30		● <i>Corydalis cava</i> , <i>Adoxa moschatellina</i> , <i>Ficaria verna</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Arum maculatum</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Lamium maculatum</i> , <i>Anemone nemorosa</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Stellaria holostea</i>	
		EP 4		L2.3/L2.4 - Tvrdé luhy nížinných řek/Měkké luhy nížinných řek	
		PP 6		1BC-C(3)4/1BC-C(4)5a/2BC-C(4)5a/1C(4)5a/2C(4)5a/1B-C5a/2B-C5a - Ulmi-fraxineta carpini inferiora/Querci roboris-fraxineta inferiora/Querci roboris-fraxineta superiora/Ulmi-fraxineta populi inferiora/Ulmi-fraxineta populi superiora/Saliceta albae inferiora/Saliceta albae superiora	
		IH - C 7,16		LBA06/LBA07/LBA05/KAC - <i>Ficario vernae-Ulmetum campestris</i> / <i>Fraxino pannonicae- Ulmetum glabrae</i> (jen PLO 35 !!)/ <i>Pruno padi-Fraxinetum excelsioris</i> / <i>Salicion albae</i>	
	Je společenstvem příznivějších náplavů zaplavovaných jen výjimečně na kratší čas. Většinou lemuje okraje údolní nivy nebo je výsledkem technických úprav odtokových poměrů. Ve vrstevnaté výstavbě tvoří hlavní úroveň DB s příměsí cenných listnáčů (JS), které se podílejí na spodních patrech spolu HB, BB a četnými keři. V jihomoravských úvalech je původní JS úzkolistý. Cílová skladba, výrazná vícevrstevná struktura i vysoká produkce odpovídá přirozené.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
0	antropogenní	přechod dubové jaseniny do topolojilmové jaseniny		1Lk	antropogenní
1	modální	s ostružínkem ježíníkem		1L-	modální
2	-	bršlicový (s kopřivou)			
3	-	ostřicový			
4	sušší	válečkový			
5	vlhčí	ptačincový			
6	-	na hrůdech (s hluchavkou skvrnitou		1Lq	na hrůdech
7	specifický - měkký luh -> 1U1	štěrkovitý		1U-	měkký luh modální
8	specifický - měkký luh vlhčí -> 1U2	– podle oblastí		1Ug	měkký luh vlhčí
9	specifický - štěrkopískový	jasanová doubrava a dubová jasenina		1Lg	podmáčený

