

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (<i>KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010</i>)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (<i>BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971</i>)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (<i>VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013</i>)	
1M	CHUDÁ BOROVÁ DOUBRAVA <i>Pineto-Quercetum arenosum (oligotrophicum)</i>	BO 24	• extrazonální • zejména štěrkopískové terasy v Polabí; Dolno-moravský úval, zvlněné terény plošin, pleistocenní a holocenní písky, arenický podzol, kryptopodzol arenický, regozem arenická, kambizem arenická podzolovaná , sypká, nesoudržná, propustná, vysychavá • PLO: 2,6,9,10,15,17,18,33,35 • 24 651,61 ha – 0,90 %	DBZ 5-8 BO 2-5 BŘ ±1 BK 0±	
		DB 20		• <i>Festuca ovina</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Corynephorus canescens</i> , <i>Festuca psammophila</i> , <i>Pleurozium schreberi</i>	
		EP 1,5		L7.3/L7.4 - Subkontinentální borové doubravy/Acidofilní doubravy na písku	
		PP 2,5		2A-AB2-3/3A-AB2-3/1A-AB1-2 - Pini-querceta inferiora/Pini-querceta superiora/Pini-querceta arenosa	
		IH - C		LDA03/LDA01 - <i>Vaccinio vitis-idaee-Quercetum roboris/Luzulo luzuloidis-Quercetum petraee</i>	
		2,74			
Má poněkud samostatné postavení mezi společenstvy DBZ a BO i v rámci kat. M. V xerothermních oblastech nížin (1. – 2. lvs) ve vyhraněných ± písčitých stanovištích se vytvořily podmínky pro středně vitální DBZ i BO doprovázené BŘ a JŘ. V cílové skladbě je ekonomickou dřevinou BO, v příměsi DBZ, jehož funkcí je především zajištění trvalosti ekosystému, kterou plní i jako podúrovňový, současně podporuje BO.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní		iniciální stadia	1Mk	antropogenní
1	modální		kostřavová	1M-	modální
2	chudší		metlicová		
3	bohatší		borůvková	1Ms	svěžejší
4	sušší		svěží se třtinou a ostružiníkem	1Mc	sušší
5	vlhčí		druhotná		
6	-		na dunách (se třtinou rákosovitou a na vyvýšeninách)	1Mq	na dunách
7	-		– podle oblastí (brusinková)		
8	-		– podle oblastí		
9	specifická - na dunách				

