

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
10	OGLEJENÁ SVĚŽÍ LIPOVÁ DOUBRAVA (Carpini-)Tilieto- Quercetum vario- humidum mesotrophicum	DB 28	● slíny a sprašové překryvy nížin a nižších pahorkatin, plošiny, mírné svahy, pararendzina pelická-oglejená, hnědozem oglejená, kambizem oglejená, pelická, luvizem oglejená , hluboká, střídavě vlhká, (vysýchavá), hlinitá až jílovitá ● PLO: 2,8,17,18,26,33 ● 19 255,42 ha – 0,70 %	DBL(DBZ) 6-8 HB ±3 LP 1-2 (JV JS JL) 0± OS 0± BK 0±	
		EP 2,5		● <i>Galium sylvaticum, Potentilla alba, Serratula tinctoria, Stellaria holostea, Galium boreale, Anemone nemorosa, Betonica officinalis, Carex montana, Molinia arundinacea, Melampyrum nemorosum, Convallaria majalis</i> L3.1/L3.3/L3.4/L6.4 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Panonské dubohabřiny/Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 1B-BD(3)4/ 2B-BD(3)4 - Tili-querceta roboris LBB01/LBB02/LBB03/LBB04/LCC03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/Stellario holostea-Carpinetum betuli/Carici pilosae-Carpinetum betuli/Primulo veris-Carpinetum betuli/Melico pictae-Quercetum roboris</i>	
		PP 4			
		IH - C			
		6,73			
Subkontinentální lp DB jsou vázány na bohatší (± vápnité), slinité příp. obohacené písčité periodicky zamokřované ale zároveň i vysýchající půdy s nevýrazným humusovým horizontem (mineralizace) v 1. a 2. lvs s teplým (subkont.) klimatem. Do úrovně dominantního DBL (část DBZ) zasahuje významně LP, LPV, která se podílí s HB a příměsí OS, BŘ i na podúrovni. Prakticky chybí BK a JD. V cílové skladbě je nositelem trvalosti ekosystému DBL a LP, LPV.					
			Lesní typy:	Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní	- podle oblastí (ostřicová - písčitá)			
1	modální	mochnová		10-	modální
2	chudší	svízelová		10c	sušší, kyselejší
3	bohatší	se třtinou rákosovitou			
4	-	bezkolencová			
5	vlhčí	s metlicí trsnatou		10g	vlhčí
6	-	ostružiníková			
7	-	mařinková			
8	specifická - sušší bohatší	ptačincová			
9	specifická - písčitá	lipnicová s kostřavou ovčí		10p	písčitá

