

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1P	OGLEJENÁ KYSELÁ BŘEZOVÁ DOUBRAVA <i>Betuleto-Quercetum variohumidum acidophilum</i>	SM 24	• na terasách úvalů, v nížinách a pánvích (jihočeské) na chudých horninách, přechod mezi podzolem oglejeným arenickým a pseudoglejem dystrickým, na spraši přechod mezi kambizemí oglejenou a pseudoglejem kambickým , hluboká, jílovitopísčitá, jílovitohlinitá, vespod mokrá • PLO: 2,10,17,18,28,31,35,36,38 • 5 640,24 ha – 0,21 %	DBL(DBZ) 5-8 (BŘ BŘP) 1-3 LPM 0-1 BO ±3 SM 0-1 OS 0±	
		BO 26		• <i>Molinia arundinacea</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>C. canescens</i> , <i>C. arundinacea</i>	
		DB 24		L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	
		EP 2		1A-AB4/2-3A-AB4/1A4/2-3A4/1AB4/2-3AB4 - <i>Betuli-querceta roboris</i>	
		PP 3		LDA04 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris</i>	
		IH - C			
		4,44			
Je příznivější variantou (oproti 1Q) půdně podmíněné břDB na střídavě zamokřovaných a vysychavých „chladných“ půdách v klimatickém rozpětí 1.-4. lvs, výrazně ovlivněném mezoklimatem těchto poloh. V mírně rozvolněných porostech DB a BŘ tvoří příměs jen OS a extrazonální SM v nesouvislém podrostu. Ekonomickou dřevinou cílové skladby je BO střední kvality, která s DB tvoří hlavní úroveň nad krycí a podpůrnou etáží dřevin s omezenými melioračními účinky (brání degradaci půdy).					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	iniciální stadia (na výsypkách)		1Pk	antropogenní
1	modální	ostřicová		1P-	modální
2	chudší	třtinová		1Pm	chudší
3	bohatší	(se smrkem) vátých písků,		1Ps	bohatší
4	sušší	hasivková (se třtinou rákos.) (s ostružiníkem)			
5	-	borůvková s bělomechem			
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

