

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
1S	SVĚŽÍ DOUBRAVA (NA PÍSCÍCH - HABROVÁ) (Carpineto)- Quercetum (oligomesotrophicum) arenosum	BO 24	- na mírně obohacených píscích a štěrkopísčitých překryvech v úvalech řek (Polabí, Břeclavsko, Bzenecko), zvlněné plošiny, kambizem arenická, hnědozem arenická, luvická, regozem arenická písčitá, vysychavá-mírně oglejená • PLO: 2,5,10,17,18,33,35 • 20 781,36 ha – 0,76 %	DBZ 5-7 HB 0-1 BO 0-3 LPM 0-2 (JLM JV JS OS BŘ BB TŘ) 0-1	
		DB 24		• <i>Calamagrostis epigeios</i>, <i>Calamagrostis arundinacea</i>, <i>Rubus fruticosus</i> agg., <i>Poa nemoralis</i>, <i>Festuca ovina</i>, <i>Coronilla varia</i>, <i>Carex montana</i>, <i>Anthericum ramosum</i>, <i>Hieracium pilosella</i>, <i>Luzula campestris</i>, <i>Euphorbia cyparissias</i>, <i>Armeria vulgaris</i>, <i>Brachypodium sylvaticum</i>, <i>Melica nutans</i>	
		EP 1,5		L3.1/L7.4/L6.3/L3.1/L3.4/L7.1 - Hercynské dubohabřiny/Acidofilní doubravy na písku/Panonské teplomilné doubravy na písku/Hercynské dubohabřiny/Panonské dubohabřiny/Suché acidofilní doubravy	
		PP 2,5		1B2-3/1AB2-3/1AB3/1B3 - Ligustri-querceta arenosa/Querceta/Ligustri-querceta arenosa	
		IH - C		LBB01/LDA01/LCB02/LBB04 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i> / <i>Carici fritschii-Quercetum roboris</i> / <i>Primulo veris-Carpinetum betuli</i>	
		3,33			
I při poměrně specifických písčitých půdních podmínkách je lesní společenstvo vzhledem k živinově příznivějším vlastnostem těchto půd málo vyhraněno mezi kyselou doubravou a habrovou doubravou. Tomu odpovídá i skladba DBZ s HB, ale i s BO, a příměs LP i BŘ a průměrný vzrůst dřevin odpovídající výšce překryvů (dun) a složení písku. V cílové skladbě těchto „příznivějších písků“ je ekologická stabilita vázána na DBZ (na rozdíl od chudších dun s BO). U BO je důležitý místní nížinný ekotyp.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	ve vytěžených písčících		1Sk	antropogenní
1	modální	– podle oblastí		1S-	modální
2	chudší	válečková			
3	bohatší	s ostricí horskou			
4	-	strdivková (ostružiníková)			
5	vlhčí	– podle oblastí		1Sg	vlhčí
6	-	– podle oblastí			
7	-	na dunách vátých písků		1Sc	sušší, kyselejší
8	specifická - nepísčitá	– podle oblastí			
9	specifická - na dunách	s lipnicí úzkolistou			

