

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP			
		IH			
		cena			
1W	VÁPENCOVÁ HABROVÁ DOUBRAVA <i>Carpineto-Quercetum calcarium</i>	DB 18	• v horních částech slunných svahů a suchých hřebítků, v nížině i v pahorkatině na vápencích, , rendzina kambická až suťová přechází do kambizemě vyluhované karbonátové , stř. hluboká, kamenitá, ne zcela vyvinutá • PLO: 8 • 584 ha – 0,02%	(DBZ DBP) 6-7 HB ±2 BK 0-1 LP ±2 JV ±1 břek TŘ BB 0±	
		EP –5		• <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamintha clinopodium</i> + vápnomilné druhy	
		PP –3			
		IH -D			
		1,76			
Vápencová obdoba hbDB (1B). Specifické (vysýchavé) půdní vylišení na přechodu mezi kat. C a B a A příp. 1. a 2. LVS (Jednotka zrušena -> 1-2C, 2W)					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
do r. 2015			od r. 2016		
0				1W-	modální
1					
2	lipnicová	-> 2W			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

