

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘÍROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)				
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ				
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)				
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)				
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)				
1X	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DOUBRAVA (DŘÍNOVÁ) <i>Corneto-Quercetum xerothermicum</i>	DB 12	• roztroušeně v nejteplejších oblastech na slunných bazických substrátech; bazická litozem, litická-modální pararendzina, ranker, rendzina ; středně kyselé - neutrální, mělké, suché, drolivé • PLO: 2,4,5,8,9,17,18,30,33,35,36,38 • 1 874,21 ha – 0,07 %	DBZ 2-6 DBP 1-6 HB 1 LP ±1 BB ±1 CER 0-1 JV 0± dřín, břek, muk				
		EP 5		• <i>Teucrium chamaedrys, Inula salicina, Galium tinctoria, Galium glauca, Lathyrus niger, Anthericum ramosum, Bupleurum falcatum, Lathyrus pannonicus, Dictamnus albus, Clematis recta, Geranium sanguineum, Carex digitata, Carex humilis, Brachypodium pinnatum, Sesleria calcaria, Stipa capillata, Stipa joannis, (Carex pediformis agg.)</i>				
		PP 1		L6.1/L6.4/L6.2 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy/Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy/Panonské teplomilné doubravy na spraši				
		IH - E		1D1 - Corni-querceta petraeae-pubescentis humilia				
		1,33		LCA01/LCA02/LCA03/LCB01 - <i>Lathyro collini-Quercetum pubescentis/Lithospermo purpureocaerulei-Quercetum pubescentis/Euphorbio-Quercetum/Quercetum pubescenti-roboris</i>				
		Je odrazem semiaridního klimatu a s ním spojeným hlubokým prosycháním půd. Půdy jsou často v iniciálním stadiu nebo erozivními zbytky vyvinutých půd s nízkou srážkovou kapacitou a rychlou mineralizací opadu. Podmiňují vznik rozvolněných porostů nebo jen shluky a řediny DBZ, místy s DBP, ve svěží variantě s HB a zakrslou LP. Nechybí BB, muk, břek, ráz bohatého keřového patra často určuje dřín. Cílem je udržet co nejpřirozenější stav.						
		Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR			
		od r. 2019		do r. 2018				
		0		antropogenní	iniciální stadia (sběrný)	1Xk	antropogenní	
		1		karbonátová	s válečkou prapořitou, na spraši	1Xw	vápencová	
2	silikátová	(na pararendzině); karbonátová	1Xb	bazická - silikátová				
3	acerózní	na rankeru, silikátová	1Xa	kamenitá acerózní				
4	-	s javorem						
5	-	s habrem	1X-	modální				
6	-	skalní lesostep	1Xi	iniciální				
7	specifická - na spraši	-	1Xx	vápnitá				
8	extrémní - modální	drnová lesostep	1Xh	zahliněná - sprašová				
9	extrémní - skeletnatější	skalní lesostep						

