

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘÍROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)				
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ				
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)				
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)				
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)				
1Z	ZAKRSLÁ DOUBRAVA <i>Quercetum humile</i>	BO 16	● mozaikovitě, skalky, suťové osypy, v pahorkatině, ranker kambický, modální, litický, kambizem rankerová oligotrofní, mezotrofní, litozem, regozem, pelozem, silně vysýchavá, mělká, kamenitá ● PLO: 1-10,12,15-18, 30,31,33,35 ● 5 374,21 ha – 0,20 %	DBZ 6-9 BK 0± HB 0-1 BO ±3 LPM 0-1 BŘ ±2 JŘ břek muk + ● <i>Viscaria vulgaris</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Anthericum ramosum</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Jasione montana</i> , <i>Centaurea triumphetii</i> , <i>Festuca ovina</i> , (<i>Brachypodium pinnatum</i>) L6.5/L6.4 – Acidofilní teplomilné doubravy/Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 1AB-B1-2/2AB-B1-2/1BD1-2/2BD1-2 - <i>Querceta humilia inferiora</i> / <i>Querceta humilia superiora</i> / <i>Ligustri-querceta humilia</i> LCC01/LCC02/LCA03/LDA02 - <i>Sorbo torminalis-Quercetum</i> / <i>Genisto pilosae-Quercetum petraeae</i> / <i>Euphorbio-Quercetum</i> / <i>Viscario vulgaris-Quercetum petraeae</i>				
		DB 12						
		EP 5						
		PP 1						
		IH - E						
		1,15						
		Blíží se chudší formě lesostepi na převážně kyselých horninách. Značné vysýchání a extrémní insolace vedly ke vzniku nesmíšených značně rozvolněných doubrav omezeného vzrůstu s příměsí BŘ, v extrémních polohách s BO, na příznivějších přechodech do 2. lvs s HB. Cílem je udržování přirozeného stavu. Při změněném stavu je zvýšený podíl BO (do 50 %) přípustný (ekologicky únosný), zajišťuje-li listnatá část porostu krytí půdy, melioraci i porostní klima.						
		Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
		od r. 2019				do r. 2018		
		0				antropogenní	– podle oblastí	
1	modální	tolitová		1Z-	modální			
2	chudší	s ostřicí nízkou						
3	bohatší	kostřavová (s lipnicí hajní)		1Zs	bohatší			
4	-			1Zi	iniciální			
5	-	– podle oblastí						
6	-							
7	-	(hb) s válečkou prapořitou						
8	specifická - hlinitá	lipnicová						
9	specifická - extrémní	biková						

