

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2B	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum mesotrophicum</i>	BO 24	• v okrajích úvalů a v (moravsko)karpatských pahorkatinách na plošinách a svazích bohatších hornin, ve vyšších polohách jen slunné svahy a hřbety, pararendziny, kambizem modální mezotrofní, vyluhovaná karbonátová, eutrofní , středně hluboká-hluboká, vysýchavá • PLO: 1,2,4-10,17-19,23,26,29-31, 33-38,41 • 24 308,99 ha – 0,89 %	DB 6-7 BK 3-4 LP ±1 HB 1 (JV JS) ±1 břek + (CER +) TŘ + JL+	
		DB 24		• <i>Brachypodium sylvaticum, Galium odoratum, Melica nutans, Stellaria holostea, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Pulmonaria officinalis, Carex sylvatica, Corydalis cava, Anemone nemorosa</i>	
		BK 24			
		EP 2,5			
		PP 4			
		IH - C			
		4,65		L3.1/L3.3 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny	
				2BD3/2B-BD3/2B-BC3 - Fagi-querceta tiliae/Fagi-querceta typica/Fagi-querceta aceris	
				LBB01/LBB03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>	
Typická klimaxová bkDB má oproti hbDB v 2. lvs příznivější a trvalejší půdní vlhkost, která umožňuje vedle DBZ (na vlhčích půdách DB na suchých CER) s podrostem HB i uplatnění BK, popř. LP, většinou v podúrovni na vlhčí půdě jednotlivě i v úrovni při vícevrstevné výstavbě porostu. V cílové skladbě je DBZ (převážně kvalitní) vhodnou ekonomickou dřevinou, v příměsi BK, popř. BO. Souvislou meliorační etáž tvoří stinné dřeviny.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	iniciální stadia na výsypkách		2Bk	antropogenní
1	modální	lipnicová (s mařinkou)		2B-	modální
2	chudší	strdivková (s bažankou)		2Bc	sušší, kyselejší
3	nitrofilnější	mařinková			
4	sušší	– podle oblastí			
5	-	– podle oblastí		2Blp	lipová
6	-	– podle oblastí			
7	skeletnatější	ptačincová		2Ba	kamenitá acerozní
8	-				
9	-	svahová		2Be	svahová

