

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
2D	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum acerosum deluvium</i>	SM 28	• v pahorkatině a v okrajích úvalů, na úpatí svahů, v úžlabinách, kambizem modální eubazická, melanická, oglejená-pelická, hnědozem modální, oglejená, pararendzina kambická oglejená - pelická, méně smonice, černozem, hluboká, vysychavá, hlinitá, humózní, nitrofilní • PLO: 1,2,4-10, 17,18,23,26,29-31,33-38,41 • 12 655,29 ha – 0,46 %	DB 5-7 BK 1-3 HB ±2 JV ±1 JS 0±1 LP ±2 JL ±1 (břek BB tis) 0-1		
		BO 24		• <i>Mercurialis perennis, Aegopodium podagraria, Lamium maculatum, Chaerophyllum temulum, Asarum europaeum, Impatiens noli-tangere</i>		
		DB 26		<i>Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Geranium robertianum, Anemone nemorosa</i>		
		BK 26		L3.1/L3.3 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny		
		EP 2,5		2BC3 - Fagi-querceta aceris		
		PP 4,5		LBB01/LBB03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>		
		IH – C				
		7,33				
Většinou na minerálně bohatých hlinitých deluviích s půdou neovlivněnou přídatnou vodou, ale ronem a tím hlubším prohumózněním. Tím se blíží acerózním společenstvům (kat. A), s nimiž má shodnou dřevinnou skladbu, ale liší se vyvinutou půdou a bonitou dřevin. Cílová skladba se shoduje s přirozenou. Více vyhraněna je vrstevnatost porostu udržováním souvislé spodní etáže ke krytí půdy i podpoře kvality úrovnových dřevin. DBZ, DB plní v sesuvných územích i zpevňující funkci.						
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018			
0	antropogenní		iniciální stadia na výsypkách		2Dk	antropogenní
1	modální		válečková		2D-	modální
2	chudší		– podle oblastí			
3	-		bršlicová			
4	sušší		s ostricí chlupatou			
5	vlhčí		strdivková			
6	-		– podle oblastí			
7	-		– podle oblastí		2Dw	vápencová
8	specifická - terasová		ptačincová		2Du	úžlabní
9	specifická -roklinová		(svahová) – podle oblastí		2De	svahová

