

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)			
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ			
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)			
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)			
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)			
2F	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum lpidosum mesotrophicum</i>	BO 24	• kamenité svahy a hřebeny nižších pahorkatin, na slunných svazích ve vyšších polohách, bohatší podloží, rankerová kambizem až kambický ranker ; středně hluboká, slabě vysychavá, propustná • PLO: <i>nová jednotka</i> <- 2N • 229,94 ha 0,01 %	DB 5-7 BK 1-3 HB ±2 LP ±2 JV 0-1 JD 0± (BŘ BB TŘ) 0±			
		DB 24		• <i>Calamagrostis arundinacea, Rubus fruticosus, Oxalis acetosella, Fragaria vesca, Mycelis muralis, Hieracium murorum, Galium rotundifolium, Avenella flexuosa, Senecio nemorensis agg., Viola sylvatica, Melica nutans, Poa nemoralis</i>			
		EP 4		L3.1 - Hercynské dubohabřiny			
		PP 2		2B3 - Fagi-querceta typica			
		IH - D		LBB01 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>			
		-		Na minerálně bohatším podloží se liší od kategorie S kamenitou půdou. V dřevinné skladbě se vedle DBZ významně podílí BK s příměsí HB, a LP. V cílové skladbě je ekonomickou dřevinou BO, případně i kvalitní DBZ(LP). Spolu s BK a LP a jejich melioračními účinky, zajišťuje DBZ trvalost ekosystému lesa.			
				Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019	do r. 2018		
0				antropogenní			
1				modální	se třtinou rákosovitou <- 2N	2F-	modální
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
6				-			
7				-			
8				-			
9				-			

