

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2G	GLEJOVÁ DOUBRAVA S JEDLÍ (PODMÁČENÁ) <i>Quercetum abietinum paludosum mesotrophicum</i>	DB 24-28	• plochy terénních zlomů pod pahorkatinami, úžlabiny v nížinách na třetihorních jílech, glej pelický, modální humózní, ojediněle kambický, pseudoglej glejový - pelický , jílovitopísčitá, dolů jílovitá, trvale zamokřená • PLO: 2,3,8,9,17,26,31,33 • 739,79 ha – 0,03 %	DB 4-7 JD 1-3 LP ±1 HB ±1 OLL 0-3 (BK OS SM JV JS) + BŘ 0±	
		SM 26-28		• <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Calamagrostis canescens</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Juncus sp.</i>	
		JD 24		L7.2/L3.1 - Vlhké acidofilní doubravy/Hercynské dubohabřiny	
		OL 24		2B4 - Tili-querceta roboris superiora	
		EP – 3		LDA04/LBB01 - <i>Holco mollis</i> - <i>Quercetum roboris</i> / <i>Galio sylvatici</i> - <i>Carpinetum betuli</i>	
		PP –4,5			
		IH - C			
		6,52			
Nižší stupeň jdDB je vzhledem k chladnějšímú mezoklimatu podmačených půd málo vyhraněný. Specifická je na slínech s HB či na obohacených podmačených písčích s LP a OL.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		přesličková (nižší stupeň)	2G-	modální
2	-		ostřicová (nižší stupeň)		
3	bohatší				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

