

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2H	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA (ŽIVNÁ - SPRAŠOVÁ) <i>Fageto-Quercetum illimerosum mesotrophicum</i>	SM 24	• nižší pahorkatiny, plošiny a mírné svahy, horniny s překryvem sprašových hlín, hnědozem, luzizem modální mezotrofní či oglejená, pararendzina kambická vyluhovaná, kambizem luvická mezotrofní • PLO: 2,4-6,8-10,12,15,17,18,23, 26,29-31,33-38, 41 • 37 709,00 ha – 1,38 %	DB 5-7 BK 1-3 HB 1-2 JD 0± LP ±2 břek + JV + JS	
		BO 24		• <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Galium sylvaticum</i> , <i>Convallaria majalis</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Melampyrum nemorosum</i> , <i>Lathyrus sp. div.</i> , <i>Carex pilosa</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Pulmonaria officinalis</i> , <i>Carex montana</i> , <i>Corydalis cava</i> , <i>Anemone nemorosa</i>	
		DB 24		L3.1/L3.3 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny	
		BK 24		2B3/2BD3 - Fagi-querceta typica/Fagi-querceta tiliae	
		EP 2		LBB01/LBB03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>	
		PP 3,5			
		IH – B			
4,81					
Klimaxová bkDB charakteristická fyzikálními vlastnostmi hlinitých mírně uléhavých a mírně oglejených půd, v létě prosýchavých a jen mírně prohumózněných, se skladbou a výstavbou porostů shodnou s bohatou bkDB. Pro cílovou skladbu je rozhodující kvalitní úroveň DBZ, DB má na „hlínách“ své optimum. BK, popř. LP, LPV zasahují do úrovně jen jednotlivé, převážně tvoří s HB, JV a keři etáž ke krytí půdy, melioraci i podpoře kvality DBZ, DB.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní	iniciální stadia		2Hk	antropogenní
1	modální	srhová		2H-	modální
2	chudší	s ostřicí chlupatou		2Hc	sušší, kyselejší
3	bohatší	(biková) s ostřicí chlupatou (horskou)			
4	sušší	s ostřicí horskou (a chlupatou)			
5	vlhčí	biková (s ostřicí horskou)		2Hg	vlhčí
6	-	šťavelová (se starčkem) (se svízelem drsným)			
7	-	– podle oblastí		2Hlp	lipová
8	-	– podle oblastí			
9	-	– podle oblastí		2He	svahová

