

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (<i>KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010</i>)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (<i>BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971</i>)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (<i>VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013</i>)	
2K	Kyselá buková DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum acidophilum</i>	DB 20	• v pahorkatině, na svazích i plošinách na kyselém substrátu, často na pískovcích a štěrkopiscích, kambizem modální oligotrofní, dystrická, arenická oligotrofní, středně hluboká, ± štěrkovitá, vysýchavá • PLO: 1,2,4-10,12,15-19,23,26,29- 31,33,34,36 • 49 745,13 ha – 1,82 %	DBZ 6-7 BK 1-3 BŘ ±1 BO 0-1 (LPM HB) 0± • <i>Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Festuca ovina, Avenella flexuosa, Melampyrum pratense, Hieracium murorum, Genista germanica, Carex pilulifera</i> L7.1 - Suché acidofilní doubravy 2AB3 - Fagi-querceta LDA01 - <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>	
		BK 22			
		SM 22			
		BO 22			
		EP 1			
		PP 2			
		IH - C			
		2,58			
	Klimaxová buková doubrava v „kyselé“ variantě na minerálně chudším podloží se zpomaleným rozkladem a hromaděním opadu umožňuje výraznější převahu i slabě průměrného DBZ nad méně vitálním BK a také příměs BO a BŘ. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému DBZ i BK zčásti BŘ. DBZ se podílí na hlavní úrovni, BK je základem meliorační (krycí) etáže stinných listnáčů.				
	Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí		2Kk	antropogenní
1	modální	metlicová		2K-	modální
2	chudší	s ostřicí kulkonosnou			
3	-	biková		2Kp	písčítá
4	sušší	kostřavová			
5	vlhčí	borůvková		2Km	chudší
6	-	– podle oblastí			
7	skeletnatější	s bikou chlupatou		2Kh	zahliněná
8	-	se třtinou rákosovitou		2Kn	kamenitější
9	specifická - písčítá	(svahová) biková (s borůvkou)		2Ke	svahová

