

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCENŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2N	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum lapidosum acidophilum</i>	BO 20	• kamenité svahy a hřebeny nižších pahorkatin, na slunných svazích ve vyšších polohách, chudší podloží, přechod kambického rankeru do rankerové kambizemě , středně hluboká, slabě vysychavá, propustná • PLO: 1,4-10,12,15,16,18,30,31,33-36,38 • 2 052,31 ha – 0,07 %	DBZ 5-8 BK 1-3 BO ±2 HB 0± LPM 0± BŘ ±1 JV 0±	
		DB 20		• <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Dryopteris carthusiana</i> , <i>Genista germanica</i>	
		EP 4		L7.1 - Suché acidofilní doubravy	
		PP 2		2AB3/2A(2)3 - Fagi-querceta/Querceta fagina	
		IH - D		LDA01/LDA03 - <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae/Vaccinio vitis-idaee-Quercetum roboris</i>	
		2,36			
Na minerálně chudším podloží se liší od kategorie K kamenitou půdou, poněkud menší vysychavostí půdy, (vzhledem k značné skeletovosti – kondenzaci vláhy), méně nepříznivou formou pokryvného humusu a tím i fytoocenózou. V dřevinné skladbě se na spodní etáži pod DBZ významně podílí BK s příměsí LP. V cílové skladbě je ekonomickou dřevinou BO, výjimečně i kvalitní DBZ(LP). Spolu s BK (LP), a jejich melioračními účinky, zajišťuje DBZ trvalost ekosystému lesa v tomto SLT.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019				do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální			- podle oblastí	2N-
2	chudší			borůvková	
3	bohatší			se šfavelem (a třtinou rákosovitou)	
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

