

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
20	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLOBUKOVÁ DOUBRAVA <i>Abieto-(Fagi-) Quercetum variohumidum mesotrophicum</i>	DB 28	- nížiny a pahorkatiny, hlinité překryvy, plošiny, úžlabiny, báze mírných svahů, pararendzina pelická-oglejená, hnědozem oglejená, kambizem oglejená, luvizem oglejená, pseudoglej pelický vyluhovaný, jílovitohlinitá až (písčito)hlinitá, mírně vysychavá - PLO: 2,6,8-10,17,18,23,26,29,31-34,37,39 7 622,46 ha – 0,28 %	DBL(DBZ) 6-8 JD ±2 BK 0-1 HB ±2 LP ±2 (JV JS JL) 0± (OLL OS) 0-1	
		EP 2		<i>Carex brizoides, Deschampsia cespitosa, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Calamagrostis arundinacea, Sanicula europaea, Brachypodium sylvaticum, Lysimachia nummularia</i>	
		PP 4,5		L3.1/L3.3/L7.2 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Vlhké acidofilní doubravy	
		IH - C		3B-BD(3)4 - Tili-querceta roboris fagi	
		7,04		LDA04/LBB01/LBB02 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris/Galio sylvatici-Carpinetum betuli/Stellario holostea-Carpinetum betuli</i>	
				Je edafickou variantou klimaxové bkDB na půdách s přirozenější formou oglejení v relativně chladnějších polohách 2. lvs. Pro hlavní úroveň DB je významná přirozená příměs JD, podúroveň tvoří podpůrná (krycí a meliorační) etáž stinných listnáčů (BK, LP, LPV, HB). Cílová skladba se shoduje s přirozenou, výstavba je výrazně vrstevnatá. Pro zajištění trvalosti ekosystému je vedle DB nezbytná příměs stinných list. (popř. JD). V úrovni se uplatní kvalitní DB.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019	do r. 2018
				0 antropogenní	20k antropogenní
1	modální		žindavová	20-	modální
2	chudší		válečková		
3	bohatší		s ostřicí prstnatou		
4	-		šťavelová		
5	vlhčí		ostřicová		
6	-		s metlicí trsnatou		
7	-		– podle oblastí		
8	-				
9	-				

