

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2S	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum oligomesotrophicum</i>	SM 24	• plošiny, svahy i ploché hřbety na různém podloží, překryvy sprašových hlín, nížiny a pahorkatiny, kambizem modální, rankerová, oglejená, arenická , hluboká, vysychavá • PLO: 1,2,4-10,12,15-18,23,26,29- 31,33-38,41 • 45 081,07 ha – 1,64 %	DB 5-7 BK 1-3 HB ±2 LP ±2 JV 0-1 JD 0± (BŘ BB TŘ) 0±	
		BO 24		• <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Mycelis muralis</i> , <i>Hieracium murorum</i> , <i>Galium rotundifolium</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Senecio</i> <i>nemorensis</i> agg., <i>Viola sylvatica</i> , <i>Melica nutans</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i>	
		DB 24		L3.1/L3.3/L7.1 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Suché acidofilní doubravy	
		BK 24		2B3/2AB3 - Fagi-querceta typica/Fagi-querceta	
		EP 1,5		LBB01/LBB03/LDA01 - <i>Galio sylvatici</i> -Carpinetum betuli/ <i>Carici pilosae</i> -Carpinetum betuli/ <i>Luzulo luzuloidis</i> - <i>Quercetum petraeae</i>	
		PP 3,5			
		IH - B			
		3,42			
				Středně bohatá buková doubrava je na značně vysychavých půdách v 2. lvs charakterizována spíše středně bohatou až ochuzenou fytocenózou než svěžím prostředím. Zastoupením klimaxových dřevin i typickou vrstevnatou výstavbou se shoduje s bohatou bkDB, bonita dřevin je ale průměrná. Nositel trvalosti ekosystému je DBZ i BK, který v podúrovni plní funkci meliorační, krycí i podpůrnou pro BO i DBZ.	
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí		2Sk	antropogenní
1	modální	s kapradinami		2S-	modální
2	chudší	(biková) s ostřicí prstnatou			
3	bohatší	biková (s mařinkou)			
4	sušší	biková (s lipnicí hajní)		2Sc	sušší, kyselejší
5	vlhčí	– podle oblastí		2Sp	písčitá
6	hlinitější	– podle oblastí		2Slp	lipová
7	skeletnatější	– podle oblastí			
8	-	– podle oblastí			
9	specifická - písčitá	– podle oblastí (svahová)		2Se	svahová

