

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCENŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2T	GLEJOVÁ CHUDÁ DOUBRAVA S JEDLÍ (PODMÁČENÁ) <i>Abieto-Quercetum paludosum oligotrophicum</i>	DB 20-24	• poklesliny a ploché úžlabiny, chudé horniny, nízké pahorkatiny, nejnižší polohy jihočeských pánví a Polabí, podzol glejový zrašelinělý, glej planický, histický podzolovaný, pseudoglej glejový dystrický zrašelinělý , písčité až hlinitojílovitá s vysokou hladinou spodní vody • PLO: 2,3,9,10,17,18 • 294,37 ha – 0,01 %	DB 4-6 JD 1-2 BŘ(BŘP) 1-3 BO ±3 (SM OS) ±1 OLL ±2	
		JD 22		• <i>Molinia sp.</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>C. canescens</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Lysimachia vulgaris</i>	
		BO 24			
		EP 3			
		PP 2			
		IH - D			
2,66					
				L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	
				2A-AB4 - Betuli-querceta roboris superiora	
				LDA04 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris</i>	
	Nižší stupeň jdDB, který je vzhledem k chladnějšímu mezoklimatu podmačených půd málo vyhraněný. Základní dřevinou je DB, příměs JD stoupá s chladnější polohou (inverze). Významná je příměs pionýrských dřevin a BO, která hluboce prokořeňuje (zpevňuje). V cílové skladbě je BO nejproduktivnější, DB a JD zajišťují trvalost ekosystému i desukci s přispěním BŘ(BŘP).				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		bezkolencová	2T-	modální
2	-		přesličková		
3	-		rašeliníková		
4	-				
5	vlhčí				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

