

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)																																																													
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ																																																													
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)																																																													
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)																																																													
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)																																																													
2V	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum fraxinosum humidum</i>	DB 28	- v nížinách a nižších pahorkatinách, plošiny, mírné svahy, potoční úžlabiny, s překryvy spraší a hlín, kambizem oglejená, melanická, až glejová, hnědozem oglejená, pseudoglej kambický, pararendzina pelická - oglejená, glej kambický, hluboká, vespod vlhká, písčitohlinitá až jílovitohlinitá - PLO: 2,4, 5,8-10,17,18,23,26,29,31,34,39 2 083,19 ha – 0,08 %	DBL 4-6 BK ±3 HB ±1 JV ±1 JS ±2 JL 0-1 LP ±1 OLL 0-1 JD 0-1 BB 0±																																																													
		EP 1,5		<i>Aegopodium podagraria, Festuca gigantea, Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere, Deschampsia cespitosa, Brachypodium sylvaticum, Galeobdolon luteum, Carex brisoides, Circaea sp.</i> - L3.1/L3.3/L3.2 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Polonské dubohabřiny 3BC-C(3)4/3B-BD(3)4/3B-BD4 - Fraxini-querceta roboris aceris/Tili-querceta roboris fagi - LBB01/LBB02/LBB03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli/Stellario holostea-Carpinetum betuli/Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>																																																													
		PP 5																																																															
		IH - C																																																															
		6,48																																																															
V relativně chladnějších polohách nížin s půdou oglejenou až glejovou, přitom poměrně bohatou, s příznivou humifikací, umožňuje, vedle klimaxového DB s méně vitálním BK, účast cenných listnáčů a JD ve vícevrstevné porostní výstavbě. V cílové skladbě se využije snadnější reprodukce acerózních dřevin na úkor obtížně doplňované JD a BK, v jejich okrajové poloze. Porosty kvalitního DB mají proto skladbu blízkou lužnímu společenstvu.																																																																	
<table><tr><th colspan="3">Lesní typy:</th><th colspan="2">Podsoubory lesních typů (PLT) LČR</th></tr><tr><th colspan="2">od r. 2019</th><th>do r. 2018</th><th colspan="2"></th></tr><tr><td>0</td><td>antropogenní</td><td>iniciální stadia na výsypkách</td><td>2Vk</td><td>antropogenní</td></tr><tr><td>1</td><td>modální</td><td>netýkavková</td><td>2V-</td><td>modální</td></tr><tr><td>2</td><td>chudší</td><td>s metlicí trsnatou</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>bohatší</td><td>bršlicová (s čistcem lesním)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td>ostřicová (s přesličkou)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>s metlicí trsnatou</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>jílovitější</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>skeletnatější</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>specifická - podmáčená</td><td>podmáčená</td><td>2Vg</td><td>podmáčená</td></tr></table>						Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		od r. 2019		do r. 2018			0	antropogenní	iniciální stadia na výsypkách	2Vk	antropogenní	1	modální	netýkavková	2V-	modální	2	chudší	s metlicí trsnatou			3	bohatší	bršlicová (s čistcem lesním)			4	-	ostřicová (s přesličkou)			5	-	s metlicí trsnatou			6	jílovitější				7	skeletnatější				8	-				9	specifická - podmáčená	podmáčená	2Vg	podmáčená
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR																																																														
od r. 2019		do r. 2018																																																															
0	antropogenní	iniciální stadia na výsypkách	2Vk	antropogenní																																																													
1	modální	netýkavková	2V-	modální																																																													
2	chudší	s metlicí trsnatou																																																															
3	bohatší	bršlicová (s čistcem lesním)																																																															
4	-	ostřicová (s přesličkou)																																																															
5	-	s metlicí trsnatou																																																															
6	jílovitější																																																																
7	skeletnatější																																																																
8	-																																																																
9	specifická - podmáčená	podmáčená	2Vg	podmáčená																																																													

