

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
2W	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum calcarium</i> (část ze zrušeného 1W)	DB 24	• ojediněle v Českém a Moravském krasu, rendzina kambická přechází do kambizemě vyluhované karbonátové , na hřebenech mělčí, na bázích svahů hluboká • PLO: 8 • 1 637,74 ha – 0,06 %	(DBZ DBP) 6-7 BK 1-4 HB ±2 JV ±1 JS 0± JL + LP ±1 (břek BB TŘ) 0±		
		BK 26		• <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamintha clinopodium</i> + <i>vápnomilné druhy</i>		
		EP 4,5		L3.1/L3.3/L3.2 - Hercynské dubohabřiny/Karpatské dubohabřiny/Polonské dubohabřiny		
		PP 3,5		2BD-D3 - Fagi-querceta tiliae		
		IH - D		LBB01/LBB03 - <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>		
		6,30				
	Na vápencovém podloží - není typickým klimaxem 2. lvs. Tvoří přechod mezi kategorií B a půdně i mezoklimaticky exponovanou vysychavou kategorií C. Přechodný ráz společenstva a bohatost podloží mírně zvýhodňují BK, který zasahuje i do úrovně převládajícího DBZ. Bohatá je příměs teplomilných dřevin i cenných listnáčů, četné jsou keře. V cílové skladbě je nositelem trvalosti ekosystému DBZ i BK(LP).					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019			do r. 2018		
	0	antropogenní				
	1	modální	s bažankou	2W-	modální	
	2	-				
	3	bohatší	s mařinkou			
	4	sušší				
	5	-				
	6	-				
	7	-				
	8	-				
	9	-	svahová	2We	svahová	

