

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
2Y	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum saxatile</i>	DB 16-20 BO 16-20	• pahorkatiny (Středočeská pahorkatina, Český ráj), mírně obohacené průrvovité skály a balvaniště, litozem až ranker kambický , mělká, balvanitá, sypká, suchá – mírně vlhká, kyprá • PLO: 6,8,9,10,18,31 • 259,37 ha – 0,01 %	DBZ 5-7 LPM 0-1 BK ±1 HB 0-1 BO ±2 BŘ +	
		EP –5		• <i>Dryopteris carthusiana</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Hieracium murorum</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Viscaria vulgaris</i> <i>Asplenium</i> sp., <i>Campanula persicifolia</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
		pp –1		L7.1/ L6.5 Suché acidofilní doubravy/Acidofilní teplomilné doubravy	
		IH - E		2(A)AB-B1-1/2(A)AB-B1-2 - Fagi-querceta humilia	
		1,76		LDA01/LDA02/LCC01 - <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i> / <i>Viscario vulgaris-Quercetum petraeae</i> / <i>Sorbo torminalis-Quercetum</i>	
				Oproti 2Z méně zakrslý vzrůst, roklinovitě a skalnaté polohy, místy vysychavé půdy. Exponovanost polohy podmiňují rozrůzněnost vzrůstu všech dřevin přirozené skladby. V rozvolněných porostech nevzrůstného DB tvoří příměs BK, BŘ, HB, LP, v extrémních polohách BO. Cílem je udržování či docílení přirozeného stavu.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019	do r. 2018
				0 antropogenní	na pískovcích
				1 modální	- podle oblastí
				2 -	na opuštěných lomech
				3 bohatší	
				4 -	
				5 -	
				6 -	
				7 -	
				8 -	
				9 -	odklizové haldy

