

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
22	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA <i>Fageto-Quercetum humile</i>	BO 16	• exponované terény s výchozy hornin v pahorkatině, ranker modální, litický, kambický, podzolový, kambizem rankerová, litozem, regozem , vysýchavá, kamenitá • PLO: 1,2,4-10,12,15,16,18,29-31, 33,37 • 2 046,85 ha – 0,07 %	DBZ 4-8 BK 1-3 HB 0-1 BO ±4 LPM 0-1 BŘ ±2 JŘ břek muk +		
		DB 16		• <i>Poa nemoralis</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Genista</i> sp., <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , (<i>Brachypodium pinnatum</i>)		
		EP 5		L6.5/L6.4 – Acidofilní teplomilné doubravy/Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy		
		PP 1		2(A)AB1-2/2(A)AB-B1-2/2BD1-2 - Fagi-querceta humilia/Fagi-querceta tiliae humilia		
		IH - E		LDA02/ LCA03 / LCC01/XC – <i>Viscario vulgaris-Quercetum petraeae</i> / <i>Euphorbio-Quercetum</i> / <i>Sorbo torminalis-Quercetum</i> / <i>Artemisietea vulgaris</i>		
		1,35				
		Mezoklima je oproti 1. lvs méně extrémní, ale mělké, kamenité, značně vysýchavé půdy i exponovanost polohy podmiňují omezený vzrůst všech dřevin přirozené skladby. V rozvolněných porostech nevzrůstného DB tvoří příměs jen BK a BŘ, méně HB, v extrémních polohách BO. Cílem je udržování přirozeného stavu. Při změněném stavu je zvýšený podíl BO (do 50 %) přípustný (ekologicky únosný), zajišťuje-li listnatá část porostu krytí půdy pod BO, melioraci i porostní klima.				
		Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
		od r. 2019		do r. 2018		
		0		antropogenní	– podle oblastí	2Zk
1	modální	borůvková	2Z-	modální		
2	chudší	biková (mechová)				
3	bohatší	se třtinou rákosovitou	2Zs	bohatší		
4	-	s válečkou prapořitou	2Zb	bazická		
5	-					
6	-					
7	-					
8	specifická - hlinitá	lipnicová				
9	antropogenní - odkaliště	skeletová	2Zy	skeletnatá		

