

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3A	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA <i>Tilii-Querceto-Fagetum acerosum lapidosum</i>	SM 26	• vypuklé i výrazné suťovité svahy v pahorkatině, kambizem modální až rankerová mezotrofní-eutrofní, ranker kambický mezotrofní, rendzina , silně kamenitá, vyvinutá, vysychavá, nitrofilní • PLO: 1-12,15-21,23, 24,26,28-34, 36-41 • 11 667,68 ha – 0,43 %	BK 4-6 DB 1-2 JV 1-2 LP ±2 JD 0± (HB JS JL) 0-1 (břek TŘ) 0± (tis 0±) • <i>Mercurialis perennis, Melica nutans, Galium odoratum, Poa nemoralis, Galeobdolon luteum, Geranium robertianum, Lamium maculatum, Actaea spicata, Dryopteris filix-mas</i> L5.1/L5.3 - Květnaté bučiny/Vápnomilné bučiny 3BC3/3CD-D2-3 - Querci-fageta aceris/Corni-acereta fagi/Corni-fageta inferiora LBC02/LBC01/LBD01 - <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae/Galio odorati-Fagetum sylvaticae/Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae</i>	
		BO 20			
		DB 26			
		BK 26			
		EP 4			
		PP 4			
		IH - D			
		5,66			
Na bohatých půdách s vyšší skeletovitostí, s příznivým vodním režimem a přeměnou opadu v silnější vrstvu mydátu. Dřevinná skladba se liší od klimaxové sníženým podílem DBZ, větší účastí LP, LPV a JV, KL a složitější výstavbou. V cílové skladbě je neefektivní udržování (uvolňování) DBZ, částečně nahraditelná je JD. Nositelem ekologické stability je BK, nositelem charakteru společenstva LP, LPV a JV.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		bažanková (s hluchavkou žlutou)	3A-	modální
2	chudší		strdivková		
3	-		– podle oblastí		
4	sušší		s ostřicí prstnatou (a strdivkou jednokvětou)	3Ac	sušší kyselejší
5	-		kapradinová		
6	-		(lipová bučina) lipnicová		
7	-				
8	roklinová				
9	specifická - vápencová		vápencová (s bažankou) (na rendzině)	3Aw	vápencová

