

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3B	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum mesotrophicum</i>	SM 28	• v pahorkatinách na bohatším podloží, v nížinách ve stinných a úžlabních polohách, ve vrchovině na slunných svazích, kambizem modální mezotrofní - eutrofní, vyluhovaná karbonátová, pararendzina kambická , hluboká, mírně šterkovitá • PLO: 1,2,4-12, 15-21,23,24,26,28-34,36-41 • 74 919,34 ha – 2,73 %	BK 7-8 DB 1-3 LP ±3 JD 0-1 JV±1 HB 0-1 JS + JL +	
		BO 24		• <i>Galium odoratum</i> , <i>Melica uniflora</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Melica nutans</i> , <i>Milium effusum</i> , <i>Dentaria bulbifera</i> , <i>Sanicula europaea</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Actaea spicata</i> , <i>Hepatica nobilis</i> , <i>Bromus benekenii</i>	
		DB 26		L5.1 - Květnaté bučiny	
		BK 28		3BD3/3B-BD3/3BC3 - Querci-fageta tiliae/Querci-fageta typica/Querci-fageta aceris	
		EP 3		LBC01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>	
		PP 5			
		IH - B			
		7,01			
Klimaxová dbBK s příznivou humifikací již odpovídá složení fytoceenózy s bohatě zastoupenými bučinnými druhy. V dřevinné skladbě se příznivé podmínky, především vlhkostní, projeví v převaze i vzrůstu BK a přítomnosti bonitní JD. DBZ je konkurenčně slabší a mezi stinnými dřevinami se udržuje ve světlých skupinách. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému BK (může nahradit JD i ostatní list.).					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	strdivková		3B-	modální
2	chudší	mařinková		3Bc	sušší, kyselejší
3	nitrofilnější	válečková			
4	sušší	– podle oblastí			
5	-	s ostřicí chlupatou a bršlicí,		3Bjd	jedlová
6	-	– podle oblastí		3Bh	zahliněná
7	skeletnatější	s ostružiníkem chlupatým		3Ba	kamenitá acerozní
8	-	s jedlí na svazích			
9	-	svahová		3Be	svahová

