

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3C	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum subxerothermicum</i>	SM 24	• slunné svahy, v pahorkatině na středně bohatém a bohatém podloží, kambizem modální až rankerová mezotrofní-eutrofní, často vyluhovaná karbonátová, pararendzina kambická, někdy ranker kambický , vysýchavá, ne zcela vyvinutá • PLO: 1-7, 9-12,15,16,18-21,23,24,26,28-33,36,37,39 • 9 483,66 ha – 0,35 %	BK 5-7 DB 1-3 JD 0± BO 0-1 LP ±2 HB 0± JS 0± JV 0±	
		BO 22		• <i>Poa nemoralis</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Campanula persicifolia</i> , <i>Galium sylvaticum</i> , <i>Convallaria majalis</i> , <i>Melica nutans</i> , <i>Carex digitata</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Campanula trachelium</i> , <i>Luzula luzuloides</i>	
		DB 20		L5.1/L5.4/L5.3 - Květnaté bučiny/Acidofilní bučiny/Vápnomilné bučiny	
		BK 22		3B3/3AB3/3BD3 - Querci-fageta typica/Querci-fageta/Querci-fageta tiliae	
		EP 4		LBC01/LBC03/LBE01/LBD01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Cephalanthero damasoniifagetum sylvaticae</i>	
		PP 3			
		IH - D			
		3,21			
Je silně ovlivněna půdou i polohou. Zvýšený výpar a inzolace zhoršují průběh humifikace, vedou k vysýchání půd a zhoršení podmínek pro vzrůst klimaxových dřevin. V rozvolněných porostech převažuje BK, konkurenčně slabší DBZ se udržuje ve světlých skupinách, příměs tvoří LP, HB, JV. V cílové skladbě je ekonomickou dřevinou BO. Rozhodující význam po trvalost ekosystému má BK (LP) dosahující i kvalitních sortimentů a plnicí v podúrovni funkci meliorační.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní			3Ck	antropogenní
1	modální	biková (teplomilná) (ochuzená)		3C-	modální
2	chudší	lipnicová		3Cm	chudší
3	bohatší	se strdivkou nicí			
4	-	– podle oblastí			
5	-	– podle oblastí		3Cb	bazická
6	-			3Ce	svahová
7	-				
8	specifická - vápnitá	s lipnicí		3Cx	vápnitá
9	specifická - vápencová	– podle oblastí		3Cw	vápencová

