

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3D	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum acerosum deluvium</i>	SM 28	• v pahorkatině, báze svahů, dna úžlabin, kambizem modální mezotrofní-eubazická, melanická, pelická, luvická, pararendzina kambická oglejená - pelická, hluboká, hlinitá, slabě vysychavá, humózní, mírně oglejená, nitrofilní • PLO: 1,4-10,12,15-21, 23,24,26, 28-41 • 23 603,36 ha – 0,86 %	BK 5-7 DB 1-3 HB 0-1 JV±2 LP±1 (JS JL) + JD ±1 (TŘ OS) 0±	
		BO 26		• <i>Impatiens noli-tangere</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Lamium maculatum</i> , <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Stachys sylvatica</i> <i>Dentaria enneaphyllos</i> , <i>Geranium robertianum</i> , <i>Galeobdolon luteum</i> , <i>Anemone nemorosa</i>	
		DB 28			
		BK 28			
		EP 2			
		PP 5,5			
		IH - B			
		7,13		L5.1 - Květnaté bučiny	
				3BC3 - Querci-fageta aceris	
				LBC02 (LBC05)/ LBC01/LBC03 - <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i> (<i>Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>)/ <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>	
	DbBK humusem obohacená je variantou klimaxové dbBK s příznivější humifikací, která se projeví poněkud nitrofilnější vegetací i dřevinnou skladbou a nadprůměrným vzrůstem dřevin (slabším u DBZ, DB) v převážně stupňovité (DB-skupinovité) výstavbě. Převaha a vitalita BK jej předurčují k zajištění trvalosti ekosystému i v cílové skladbě, kde s JD a příměsí cenných listnáčů se podílí na produkci i stabilitě hospodářské SM úrovně. Menší význam má meliorační podrost. Příměs DB, DBZ má význam v sesuvných územích.				
	Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019	do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí			
1	modální	válečková	3D-	modální	
2	chudší	– podle oblastí			
3	-	bršlicová (s česnekem medvědí)			
4	sušší	– podle oblastí	3Djd	jedlová	
5	vlhčí	– podle oblastí	3Dg	vlhčí	
6	-	bažanková (s piltulníkem)	3Dw	vápencová	
7	-	kapradinová			
8	specifická - terasová	ptačincová	3Du	úžlabní	
9	specifická - roklinová	(svahová) – podle oblastí	3De	svahová	

