

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3G	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA (PODMÁČENÁ) <i>Abieto-Quercetum piceosum paludosum mesotrophicum</i>	SM 26-30 DB 24-28	• podmáčené poklesliny v plošinách, ploché úžlabiny, terénní zlomy, v pahorkatinách a pánvích, glej modální humózní, ojediněle kambický, pseudoglej glejový - pelický , vespod jílovitá, vlhká až mokrá • PLO: 8,10, 12,15,17,39 • 1 030,01 ha – 0,04 %	DB 3-5 JD 3-4 SM 0-1 JV 0± OLL ±1 LP + BŘ(BŘP) + BK 0±	
		EP 3		• <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Calamagrostis canescens</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Lysimachia vulgaris</i> , <i>Juncus sp.</i>	
		PP 4,5		L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	
		IH – C		3AB4 - Abieti-querceta roboris-piceae	
		5,48		LDA04 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris</i>	
				Je edafickým klimaxem, v němž půdní vlastnosti značně překrývají rozdíly klimatických stupňů, omezují BK a vyhovují DB a JD, s mírnou převahou DB ve 2. –3. lvs. Příměs tvoří OL v mokřejších a vzrůstově slabší BK v sušších lokalitách. Přirozený je výskyt SM. V cílové skladbě porostů s nadprůměrnou produkcí SM zajišťuje trvalost ekosystému DB a především JD, která v úrovni přispívá ke stabilitě i produkci porostu.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		přesličková	3G-	modální
2	chudší		ostřicová		
3	bohatší		třtinová		
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

