

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3K	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum acidophilum</i>	SM 24	• v pahorkatinách na různých svazích, na kyselém substrátu, ve vyšších polohách jen slunné svahy, místy písčité plošiny, kambizem modální oligotrofní, dystrická, arenická, středně hluboká, čerstvá - vysychavá • PLO: 1-12,15-21,23,24,26,28-33,36- 39,41 • 134 394,91 ha – 4,90 %	BK 5-7 DB 1-3 JD 0-1 LPM 0± BO 0-1 BŘ ±1 HB 0±	
		BO 24		• <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Veronica officinalis</i> , <i>Maianthemum bifolium</i> , <i>Hieracium murorum</i> , <i>Carex pilulifera</i> , <i>Polytrichum formosum</i> , <i>Hypnum cupressiforme</i>	
		DB 22			
		BK 24			
		EP 1			
		PP 3			
		IH - B		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		2,66		3AB3/3A(2)3 - Querci-fageta/Fageta quercina	
				LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>	
Ekologické podmínky půdně méně příznivé (kyselost s hromaděním opadu), klimaticky příznivější umožňují převahu BK i ve vzrůstu (vyjma obvodu s kontinentálnějším klimatem – dešťového stínu). Méně vzrůstný DBZ více ve skupinách. V cílové skladbě je základem ekologické stability především BK. JD je ekologicky vhodná, ale nahraditelná. DBZ se v sušší „borové“ skladbě podílí na úrovni i podúrovni, ve „smrkové“ přispívá ke zpevnění (okraje). BK je základem krycí a podpůrné etáže i úrovně.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí		3Kk	antropogenní
1	modální	metlicová		3K-	modální
2	chudší	s ostřicí kulkonosnou		3Kjd	jedlová
3	bohatší	biková			
4	sušší	– podle oblastí		3Kn	kamenitější
5	vlhčí	borůvková (s metličkou křivolakou)		3Km	chudší
6	-	– podle oblastí		3Ks	svěžejší, bohatší
7	skeletnatější	– podle oblastí		3Kp	písčitá
8	-	se třtinou rákosovitou		3Kh	zahliněná
9	specifická - písčitá	svahová (– podle oblastí)		3Ke	svahová

