

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3L	JASANOVO-OLŠOVÝ LUH <i>Fraxineto-Alnetum alluviale (fontinale)</i>	OL 28	•azonální • v pahorkatinách a nižších vrchovinách, potoční aluvia, kolem prameništ, fluvizem oglejená, glejová, arenická , méně glej fluvický, kambický, prameniště: glej hydroeluviovaný, kambizem glejová , písčitá až hlinitá, provzdušněná • PLO: 1-13,15-34,36-41 • 18 352,12 ha – 0,67 %	OLL 4-8 JS 1-3 SM 0-3 (JV DBL LP VR JL OLŠ) 0±	
		DB 24		• <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Carex remota</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Lysimachia nemorum</i> , <i>Stellaria nemorum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens</i> <i>noli-tangere</i> , <i>Stachys sylvatica</i> , <i>Chrysosplenium alternifolium</i> , <i>Crepis</i> <i>paludosa</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Festuca</i> <i>gigantea</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Galeobdolon luteum</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Petasites albus</i>	
		SM 28		L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	
		EP 5		2-3BC-C(4)5a/2-3BC(4)5a - Fraxini-alneta inferiora	
		PP 5		LBA04/LBA03 - <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae/Carici remotae-Fraxinetum</i> <i>excelsioris</i>	
		IH - D			
		1,95			
Je společenstvem užších potočních aluvií podmačených proudící okysličenou vodou, která zjara nakrátko zaplavuje půdní povrch. Hladina podzemní vody je ve vegetačním období v dosahu kořenů. OL a JS tvoří břehový porost, ostatní dřeviny doplňují porost dále od břehu (pronikají sem z okolních svahů). Z keřů je častá krušina, kalina, bezy. Cílová skladba i vrstevnatá výstavba odpovídá přirozené, ve vyšších polohách přistupuje OLŠ a SM (na úkor JS).					
			Lesní typy:		
			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní		potoční		
1	modální		– podle oblastí (potoční)	3L-	modální
2	-		prameništní (zbahnělá)		
3	-		trsnatá		
4	-		– podle oblastí		
5	vlhčí				
6	-				
7	specifický - písčitý			3Lp	písčitá
8	specifický - prameništní vápnitý				
9	specifický - prameništní			3Lr	prameništní

