

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
3M	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA (BOROVÁ) <i>Querceto-Fagetum oligotrophicum</i>	SM 22	• chudé substráty v pahorkatině, na plošinách, na svazích, kambizem dystrická až podzol arenický , středně hluboká, vysychavá, propustná • PLO: 1-3,6,7,9-12,15,16,18,20,21,23,24,26,28,30,31,33 • 5 791,39 ha – 0,21 %	BK 3-5 DBZ 2-4 JD 0± BO ±3 BŘ ±1		
		BO 22		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Dicranum scoparium</i> , <i>Dicranum undulatum</i> , <i>Pleurozium schreberi</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Melampyrum pratense</i>		
		DB 20				
		EP 1				
		PP 1,5				
		IH - C				
		2,40		L5.4 - Acidofilní bučiny		
				3A(2)3 - Fageta quercina		
				LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> -Fagetum sylvaticae		
	Ekologické podmínky půdně výrazně nepříznivé s hromaděním surového humusu, vysokou aciditou a vysychavostí půdy a s klimatem (mezoklimatem) silně ovlivněným polohou (suchou, kontinentální) odpovídají „ochuzenému“ (edafickému) klimaxu dbBK se sníženou vitalitou BK, takže poměr BK a DBZ se vyrovnává. Příměs tvoří BŘ a většinou i přirozená BO. V cílové skladbě hospodářských lesů se BK a DBZ podílí na hlavní úrovni méně, k zajištění trvalosti ekosystému přispívají DBZ, BK, BŘ i v podúrovni.					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní			3Mk	antropogenní	
1	modální			3M-	modální	
2	chudší					
3	-					
4	-					
5	vlhčí					
6	-					
7	skeletnatější					
8	-					
9	-			3Me	svahová	

