

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3N	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum lapidosum acidophilum</i>	BO 22	• kamenité - balvanité svahy, ve vyšších polohách slunné, v nižších kaňony - v pahorkatině, chudší podloží, kambizem rankerová oligotrofní, méně ranker kambický , středně hluboká, čerstvě vlhká, slabě vysychavá, propustná • PLO: 1-12,15,16,18-21,23,24, 26, 28-31,33,36,38-41 • 9 396,12 ha – 0,34 %	BK 6-7 DB 2-3 JD 0-1 (HB LPM) 0± BO 0-2 BŘ + JV 0±	
		DB 20		• <i>Dryopteris carthusiana, Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme, Oxalis acetosella</i>	
		BK 22			
		SM 24			
		EP 4			
		PP 4			
		IH - D		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		2,42		3AB3 - Querci-fageta	
				LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>	
Kamenitá (kyselá) dbBK ve specifických terénních i půdních podmínkách se liší od dbBK vyvinutých půd příznivější půdní vlhkostí (kondenzační vláha meziprostor skeletu) a složitější výstavbou porostů. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému především BK, specifický charakter JV a LP. Ve vlhčí – SM – variantě se uplatní i JD, v sušší – BO – var. se udržuje DBZ (je nahraditelný ostatními listnáči).					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	Antropogenní				
1	Modální	- podle oblastí		3N-	modální
2	Chudší	se třtinou rákosovitou			
3	Bohatší	– podle oblastí			
4	Sušší	borůvková		3Nm	chudší
5	-				
6	-			3Ny	skeletovitá
7	-	iniciální stadia			
8	-			3Ne	svahová
9	-	– podle oblastí			

