

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
3P	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA <i>Abieto-Quercetum variohumidum acidophilum</i>	SM 26	• pahorkatiny, plošiny, úžlabiny, báze mírných svahů, kyselé podloží s hlinitými překryvy, pseudoglej planický, dystrický či modální, méně kambický, kambizem oglejená oligotrofní až podzolovaná , hluboká, hlinitá až jílovitohlinitá, střídavě vlhká • PLO: 2,6-10,12,15-18,26,28,29, 31,32,39 • 15 036,17 ha – 0,55 %	DB 3-4 JD 2-3 SM ±1 BO 0-1 BK 1-2 LPM 0± BŘ ±1 OS +		
		BO 24		• <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Molinia arundinacea</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Luzula pilosa</i>		
		DB 24		L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy		
		BK 28		3AB4 - Abieti-querceta roboris -piceae		
		EP –2		LDA04 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris</i>		
		PP –3				
	V kyselé jdDB překrývají výrazné půdní vlastnosti rozdíly klimatické v 2. a3. lvs a vymezený vyšší stupeň je značně schématickým přechodným SLT bez vyhraněných rozdílů růstových podmínek.	IH - C				
		3,89				
		Lesní typy:				
		od r. 2019		do r. 2018		
		0	antropogenní		3Pk	antropogenní
		1	modální	– podle oblastí	3P-	modální
		2	chudší			
		3	-	borůvková (vyšší stupeň)	3Pm	chudší
		4	-	mechová (vyšší stupeň)		
		5	-	– podle oblastí	3Pg	chlčí
		6	-	s bikou chlupatou (vyšší stupeň)		
		7	-	s molinií a hasivkou (nižší stupeň)	3Pt	vlhčí chudší
		8	-			
9	-					

