

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3Q	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA <i>Abieto-Quercetum variohumidum oligotrophicum</i>	SM 22	• chudé hlíny a jíly plošin, mírné svahy a poklesliny vyšších pahorkatin (Zábřežsko), glejový podzol, planický či dystrický pseudoglej, stagnoglej , hluboká, hlinitá až jílovitohlinitá, mírně vlhká až vysychavá, se surovým moderem až mörem • PLO: 6,9,10,12,15,31,39 • 1 443,13 ha – 0,05 %	DB 3-4 JD 1-3 BK ±2 BO ±2 SM ±1 (BŘ BŘP) 1 • <i>Molinia arundinacea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy 3A4 - <i>Querci-abieta piceosa</i> LDA04 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris</i>	
		BO 22			
		EP –2			
		PP –2,5			
		IH - C			
	2,52				
	V chudé jdDB překrývají výrazné půdní vlastnosti rozdíly klimatické v 2. a 3. lvs a vymezený vyšší stupeň je značně schématickým přechodným SLT bez vyhraněných rozdílů růstových podmínek.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0 antropogenní				
	1 modální		– podle oblastí	3Q-	modální
	2 -		bezkolencová		
	3 -				
	4 -				
	5 -				
	6 -				
	7 -				
	8 -				
	9 -				

