

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (<i>KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010</i>)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (<i>BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971</i>)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (<i>VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013</i>)	
3R	KYSELÁ RAŠELINNÁ RELIKTNÍ BOROVÁ SMRČINA <i>Piceetum relictum turfosum acidophilum</i>	SM 20-24	• plošiny, poklesliny, mírné úžlabiny, oblast kvádrových pískovců a písčitých uloženin Jihočeských pánví, organozem glejová oligotrofní, podzol histický glejový , přechodná, místy dobře rozložená rašelina • PLO: 2,39 • 1798,65 ha – 0,07 %	SM 5-8 BO 1-5 BŘP ±2 (OL OS) +	
		BŘ 18-22		• <i>Sphagnum sp., Molinia sp., Vaccinium myrtillus, Carex rostra</i> Ta, <i>Carex nigra, Carex canescens, Eriophorum sp.</i>	
		EP 3		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		PP 2,5		4A6 - Pini-piceeta turfosa	
		IH - D		LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
		2,17			
Je častější jen v pánevních lokalitách se zpomaleným odtokem vody, kde se vytvořila chudá kyselá rašelinná půda, dnes převážně odumřelá nebo odvodněná, se spodní vodou v dosahu rhizosféra a dřevinnou skladbou tajgového typu. V rozvolněných porostech SM-BO-BŘP je poměr dřevin dán stupněm zamokření. Cílová skladba odpovídá přirozené. U BO je důležitý ekotyp.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	borůvková		3R-	modální
2	-				
3	bohatší				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

