

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONIT A	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3S	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum oligomesotrophicum</i>	SM 28	• svahy a hřebeny na různých horninách, písčité nebo hlinité překryvy, v pahorkatinách, kambizem modální, oligotrofní nebo mezotrofní, arenická, hnědozem modální , hluboká, čerstvě vlhká, hlinitopísčítá- písčitohlinitá, slabě štěrkovitá • PLO: 1-12,15-21,23,24,26,28- 34,36-41 • 153 419,97 ha – 5,60 %	BK 5-7 DB 2-3 LP±1 HB 0-2 JV 0± JD 0-1 JS 0± (OS BB TR) 0±	
		BO 26		• <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Mycelis muralis</i> , <i>Senecio nemorensis</i> agg., <i>Dryopteris</i> sp. <i>Rubus idaeus</i> , <i>Carex digitata</i> , <i>Calamagrostis</i> <i>arundinacea</i> , <i>Melica nutans</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Hieracium murorum</i> , <i>Athyrium filix femina</i>	
		DB 24		L5.1/L5.4 - Květnaté bučiny/Acidofilní bučiny	
		BK 26		3B3/3AB3 - Querci-fageta typica/Querci-fageta	
		EP 1		LBC01/LBC03/LBE01 - <i>Galio odorati-fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-fagetum</i> <i>sylvaticae</i> / <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>	
		PP 4			
		IH - A			
		6,00			
Má přechodné postavení mezi živnou a kyselou řadou, které vzniká zhoršenými podmínkami v obvodu bohatších stanovišť nebo naopak příznivějšími (vlhkostně) v obvodech kyselých. Skladbou klimaxových dřevin a výstavbou se podobá bohaté dbBK, odlišuje se však nižší produkcí dřevin. Trvalost ekosystému v cílové skladbě zajišťuje především buk, který může z části nahradit jedlí a plně dub a podílí se na hlavní úrovni i meliorační etáži.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí		3Sk	antropogenní
1	modální	šťavelová		3S-	modální
2	chudší	(s jedlí) se svízelem drsným (a starčkem)		3Sjd	jedlová
3	bohatší	s ostricí prstnatou			
4	sušší	s kapradinami			
5	vlhčí	– podle oblastí		3Su	úžlabní
6	hlinitější	– podle oblastí		3Sn	kamenitější
7	skeletnatější	– podle oblastí		3Sp	písčítá
8	-	– podle oblastí		3Sc	sušší, kyselejší
9	specifická - písčítá	svahová – podle oblastí		3Se	svahová

